

Réduire les Inégalités Sociales de Santé

Quelques données chiffrées

Les inégalités sont :



SYSTEMATIQUES



ÉVITABLES



INJUSTES



IMPORTANTES



**MALADIES
PROFESSIONNELLES**

17 FOIS +

chez les ouvriers que
chez les cadres

13 ANS

**D'ÉCART
D'ESPÉRANCE DE VIE**

entre les plus
modestes et les
plus aisés



SYNDROME DÉPRESSIF

2,4 FOIS +

chez les ménages les
plus modestes que
chez les ménages les
plus aisés



DIABÈTE

2,8 FOIS +

chez les 10 % les plus
modestes que chez les
10 % les plus aisés





Les Inégalités sociales de santé concernent des comportements de santé face à des facteurs de risques, des offres de dépistage et de recours aux soins. Les inégalités sociales de santé sont identifiées

à tous les âges de la vie.



NOMBRE DE CARIES NON SOIGNÉES

EN MATERNELLE

2,5 FOIS +

chez les enfants
d'ouvriers que chez les
enfants de cadres



SURPOIDS

À L'ADOLESCENCE

3 FOIS +

chez les jeunes de 17 ans
avec des parents inactifs
qu'avec des parents
cadres



CONSOMMATION DE TABAC

**AU TROISIÈME TRIMESTRE
DE GROSSESSE**

5,8 FOIS +

fréquente chez les
ouvrières que
chez les cadres



DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

**CHEZ LES FEMMES ENTRE
50 ET 74 ANS***

1,6 FOIS +

de participation
des plus aisées par
rapport aux moins
aisées